

इन्फ्लुएन्जा (फ्लू) खोप (जीवित, इन्ट्रानेजल)

इन्फ्लुएन्जा ("फ्लू") एउटा सरुवा रोग हो जुन हरेक वर्ष प्रायः अक्टोबर र मे महिनाको बीचमा फैलिने गर्छ।

फ्लू इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरूको कारण लाग्छ र यो मुख्यतः खोकदा, हाछ्युँ गर्दा र नजिकको सम्पर्कबाट सर्छ।

फ्लू जोकोहीलाई पनि लाग्न सक्छ; यो तुरुन्तै लाग्न सक्छ र धेरै दिनसम्म निको नहुनसक्छ। लक्षणहरू उमेर अनुसार फरकहुन्छन्, तर निम्न लक्षणहरू समावेश हुनसक्छन्:

- ज्वरो आउने/जाडो हुने
- घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने
- मांसपेशी दुख्ने
- थकाइ लाग्ने,
- टाउको दुख्ने र नाकबाट पानी बग्ने वा नाक बन्द हुने

फ्लू नाबालक र साना बालबालिका, 65 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू, गर्भवती महिलाका लागि बढी खतरापूर्ण हुन्छ र निश्चित स्वास्थ्य अवस्थाहरू वा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरू उच्च जोखिममा हुन्छन्। फ्लू खोपले:

- तपाईंलाई फ्लू लाग्नबाट र तपाईंको परिवार र अन्य व्यक्तिहरूमा फ्लू फैलिनबाट बचाउँछ
- तपाईंलाई फ्लू लागिहाले पनि यसले फ्लूलाई कमगम्भीर बनाउँछ

जीवित, कमजोर इन्फ्लुएन्जा खोप (LAIV भनिने) स्वस्थ बालबालिकालाई लगाउन सकिनेछ।

यसलाई नाकमा स्प्रे गरिन्छ, यसले कुनै दुखाइ हुँदैन र फ्लू लाग्न दिँदैन। फ्लू विरुद्धको सुरक्षा विकास हुनलाई लगभग 2 हप्ता जति लाग्छ र सुरक्षा फ्लू मौसमभरि रहन्छ।

केही मानिसले उमेर, स्वास्थ्य अवस्था वा अन्य कारणहरूका लागि LAIV लगाउनुहुँदैन। कृपया बच्चामा निम्न अवस्थाहरू छन् भने यसमञ्जुरी फाराममा जानकारी उपलब्ध गराउनुहोस्:

- अण्डा सहित कुनै कुराको एलर्जी छ वा फ्लू खोप लगाउँदा एलर्जिक प्रतिक्रिया भएको छ।
- दीर्घकालीन मुटु रोग, श्वासप्रश्वास, मृगौला, कलेजो वा स्नायु प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू छन्।
- दम वा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू छ वा श्रृंखलाबद्ध रूपमा हाँचछ्यु हुने समस्या छ।
- एस्पिरिन वा एस्पिरिन समावेश उत्पादनहरूको सेवन गरिरहेको बच्चा वा किशोर हो।
कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली छ।
- अबको 7-14 दिनभित्रमा सुरक्षित वातावरण आवश्यक हुने (उदाहरणका लागि, केमोथेरापी गराइरहेको) कोही व्यक्तिलाई भेट्दैछ

कहिलेकाहीं LAIV विलम्ब गर्नुपर्छ। तपाईंको बच्चालाई सन्चो नहुँदा

- प्रायः यस्तो गरिन्छ। तिनीहरूलाई निको नहुँदासम्म खोप लगाउन विलम्ब गर्न सकिन्छ।
- बितेको 4 हप्तामा कुनै जीवित खोपहरू लगाएको छ।

खोपको प्रतिक्रियाको जोखिम

कुनै पनि औषधिले प्रतिक्रिया दिने सम्भावना हुन्छ। सामान्यतः यिनीहरू मध्यम खालका हुन्छन् र आफैं हराएर जान्छन् तर गम्भीर प्रतिक्रियाहरू पनि सम्भव हुन्छन्।

LAIV लगाउने धेरैजसो मानिसहरूलाई यसले समस्या गर्दैन। LAIV का प्रतिक्रियाहरूले फलूको सामान्य अवस्था दर्शाउन सक्छन्, रिपोर्ट गरिएका समस्याहरूमा

- नाकबाट पानी बग्ने/नाक बुझिने
- खोकी लाग्ने
- ज्वरो आउने
- टाउको दुख्ने र मासंपेशी दुख्ने
- स्वाँस्वाँ हुने
- पेट दुख्ने, वान्ता हुने वा झाडापखाला लाग्ने समस्या समावेश छन्

कुनै पनि खोप प्राप्त गरिसकेपछि देखा पर्न सक्ने समस्याहरू

कुनै पनि औषधिले गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया गराउन सक्छ, यो एकदमै दुर्लभ हुन्छ, एक मिलियन डोजमा करिब 1 जनामा देखिन सक्ने अनुमान गरिन्छ र यो प्रतिक्रिया खोप लगाएपछि केही मिनेटदेखि केही घण्टाभित्र हुनेछ। कुनै पनि औषधिको हकमा जस्तै, खोपले गम्भीर चोटपटक वा मृत्यु हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ।

कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया भएमा के गर्ने

तपाईंलाई चिन्तित पार्ने कुनै पनि लक्षणप्रति होसियार हुनुहोस्, जस्तै, गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया, अत्यन्तै उच्च ज्वरो वा असामान्य व्यवहार। गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रियामा बिबिरा आउने, अनुहार र घाँटी सुनिने, सास फेर्न गाह्रो हुने, मुटुको धड्कन छिटो-छिटो चल्ने, रिगटा लाग्ने, र कमजोर हुने लक्षणहरू समावेश हुनसक्छन्। यी लक्षणहरू खोप लगाएको केही मिनेटदेखि केही घण्टाभित्र सुरु हुनेछन्।

मैले के गर्नुपर्छ?

यदि तपाईंलाई यो गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया हो भन्ने लाग्छ वा प्रतीक्षा गर्न नसकिने अन्य आपतकालीन समस्या हो भने 999 मा फोन गर्नुहोस्।

मैले थप कुरा कसरी जान्न सक्छु?

हामीलाई 0300 123 5205 मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट www.kentcht.nhs.uk/imms मा हेर्नुहोस्।